Ulotka dla pacjenta

oscillococcinum®

GRANULKI W POJEMNIKU JEDNODAWKOWYM

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek Oscillococcinum® ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład
1 g granulek zawiera:
Substancja czynna:
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml
Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.

Zawartość w opakowaniu: 6, 12, 18, 24 lub 30 pojemników jednodawkowych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
20, rue de la Libération - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francja

Wytwórca
BOIRON SA
20, rue de la Libération - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francja

BOIRON SA
2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francja

Spis treści ulotki :

1. Co to jest lek Oscillococcinum® granulki i w jakim celu się go stosuje ?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku Oscillococcinum® granulki.
3. Jak zażywać lek Oscillococcinum® granulki ?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek Oscillococcinum® granulki ?
6. Inne informacje.

1- Co to jest lek Oscillococcinum® granulki i w jakim celu się go stosuje ?

Oscillococcinum® granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

2- Informacje ważne przed zażyciem leku Oscillococcinum® granulki.

Kiedy nie zażywać leku Oscillococcinum® granulki ?
Leku Oscillococcinum® nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oscillococcinum® granulki ?
Stosowanie leku u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku Oscillococcinum® granulki z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku Oscillococcinum® z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oscillococcinum® granulki
Lek Oscillococcinum® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3- Jak zażywać lek Oscillococcinum® granulki ?

Stosować doustnie.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku Oscillococcinum® to:
Dorośli i dzieci od 6 roku życia:
Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.
Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.
Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.
Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.
Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Oscillococcinum®: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zażycia leku Oscillococcinum®: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Oscillococcinum® granulki: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4- Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, Oscillococcinum® granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5- Jak przechowywać lek Oscillococcinum® granulki ?

Bez specjalnych wymagań.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Oscillococcinum® po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6- Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:
Boiron Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05 - 500 Piaseczno
Tel.: 22/702 66 70
Fax: 22/702 66 71
e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 01/2012

PRD.186U - 02/12

BOIRON®